QUIZ 4

1 I "segni di certezza" per l'identificazione di una gravidanza
- A. si riscontrano a livello dell'apparato genitale
- B. sono direttamente collegati alla presenza dell'embrione/feto
- C. si riscontrano al di fuori dell'apparato genitale
- D. nessuna delle precedenti

2 Quale dei seguenti è un segno di "presunzione" di gravidanza?
- A. aumento di volume dell'utero
- B. presenza di HCG nel sangue materno
- C. scialorrea e vomito
- D. amenorrea

3 Il cordone ombelicale contiene:
- A. 2 vene e 1 arteria
- B. 2 arterie e 2 vene
- C. 2 arterie e 1 vena
- D. 1 arteria e 1 vena

4 Quando si ha l'arborizzazione del muco cervicale?
- A. in fase follicolare
- B. in fase ovulatoria
- C. in fase luteinica
- D. tutte le precedenti

5 La sintomatologia caratteristica della placenta previa è:
- A. ipertono e perdite di sangue rosso vivo
- B. ipertono e perdite di sangue rosso scuro
- C. assenza di ipertono e perdite di sangue rosso vivo
- D. nessuna delle precedenti

6 La via di somministrazione dell'atosiban è:
- A. intradermica
- B. intramuscolare
- C. endovenosa
- D. vaginale

7 In cosa consiste l'amniocentesi
- A. aspirazione per via transcervicale del liquido amniotico dalla cavità uterina
- B. aspirazione per via transvaginale di liquido amniotico dalla cavità uterina
- C. aspirazione per via transaddominale di liquido amniotico dalla cavità uterina
- D. tutte le precedenti

8 Quale tra queste è un'indicazione all'amniocentesi?
- A. età materna superiore ai 35 anni
- B. età materna inferiore ai 30 anni
- C. gestante con precedente gravidanza gemellare
- D. gestante con pregresso taglio cesareo

9 I "fenomeni dinamici" del parto sono modificazioni:
- A. dei rapporti fra feto e canale da parto per effetto delle contrazioni
- B. della forma della parte presentata durante il passaggio nel canale da parto
- C. delle parti molli del canale del parto
- D. tutte le precedenti

10 La lunghezza media di un neonato è:
- A. 35 cm
- B. 40 cm
- C. 50 cm
- D. 55 cm

11 Il termine "sbarramento degli arti superiori" a quale condizione ostetrica è riconducibile?
- A. distocia di spalle
- B. presentazione di spalla
- C. parto gemellare
- D. parto podalico

12 La discinesia uterina è caratterizzata da:
- A. contrazioni deboli
- B. pause prolungate
- C. contrazioni intense e frequenti
- D. incoordinata azione contrattile

13 Nella presentazione di vertice qual è l'indice fetale?
- A. fontanella mastoidea
- B. fontanella bregmatica
- C. fontanella triangolare
- D. nessuna delle precedenti

14 Quale tra questi non è un fattore di rischio per rottura d'utero?
- A. pregressa chirurgia uterina
- B. uso della manovra di Kristeller
- C. la somministrazione di tocolitici
- D. la presentazione anomala

15 I segni di rottura d'utero intrapartum possono includere:
- A. arresto o mancata coordinazione delle contrazioni
- B. anello di Bandl patologico
- C. apprezzamento delle piccole parti fetali al di fuori dell'utero
- D. tutte le precedenti

16 L'emorragia post partum viene definita primaria quando:
- A. insorge nelle prime 24 ore dopo il parto
- B. insorge tra le 24 e le 72 ore dopo il parto
- C. insorge dopo le 72 ore dal parto
- D. insorge tra le prime 24 ore e 12 settimane dopo il parto

17 Nelle emorragie post partum quali metodi sono utili per quantificare la perdita ematica dal tratto genitale
- A. stima visuale
- B. utilizzo di sacche trasparenti graduate per la raccolta di sangue
- C. peso di teli , garze e pezze intrise di sangue
- D. tutte le precedenti

18 Secondo le LG SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) si parla di fallimento induttivo qualora non si riesca a raggiungere la fase attiva del travaglio
- A. dopo almeno 6 ore di infusione ossitocica e membrane rotte
- B. dopo almeno 8 ore di infusione ossitocica
- C. dopo almeno 8 ore d infusione ossitocica e membrane rotte
- D. dopo almeno 12 ore di infusione ossitocica e membrane rotte

19 L'ecografia "office" è un'ecografia di:
- A. primo livello
- B. secondo livello
- C. supporto alla visita
- D. obbligatoria ad ogni visita

20 L'immersione in acqua può essere offerta
- A. prima della 37^settimana di gestazione
- B. tra la 37^ e la 42^settimana di gestazione non complicata
- C. a qualsiasi epoca gestazionale
- D. solo tra la 39^ e la 40^ settimana di gestazione

QUIZ 4

21 Quale tra questi è un criterio di inclusione al travaglio e parto in acqua?
- A. placenta previa
- B. membrane rotte da meno di 24 ore
- C. liquido amniotico tinto M2/M3
- D. infusione ossitocica in corso

22 Cosa si intende con il termine menometrorragia?
- A. mestruazione assente
- B. sanguinamento uterino prolungato o eccessivo, irregolare e più frequente del normale
- C. flusso mestruale normale
- D. flusso mestruale scarso

23 Quali tra questi è un" fenomeno plastico" del parto?
- A. distensione della vagina e del perineo
- B. progressione
- C. formazione della borsa amniocoriale
- D. nessuna delle precedenti

24 Le complicanze più frequenti dell'iperpiressia nei neonati sono le:
- A. convulsioni
- B. encefaliti
- C. epilessie
- D. nessuna delle precedenti

25 Il riflesso di suzione nel neonato può essere stimolato toccando:
- A. il palato molle o il faringe posteriore
- B. leggermente la punta del naso con un rapido movimento verso l'alto
- C. la cute della guancia o dell'angolo della rima buccale
- D. nessuna delle precedenti

26 Indicare qual è la causa di alti livelli materni di alfa fetoproteina alla 17esima settimana di gestazione:
- A. sindrome di Down
- B. anencefalia
- C. focomelia
- D. nessuna delle precedenti

27 Indicare la via di somministrazione più agile e veloce per i neonati nelle prime ore di vita:
- A. incannulamento vena ombelicale
- B. sottocutanea
- C. rettale
- D. inalazione

28 Caput succedaneo, chiamato anche tumore da parto:
- A. per la sua risoluzione sono necessari molti mesi
- B. è un'area di edema che si forma tra sottocutaneo e periostio
- C. è favorito da un passaggio molto veloce nel canale del parto
- D. nessuna delle precedenti

29 L'analgesia epidurale è controindicata in caso di infezione da Sars-Cov-2?
- A. si, è controindicata
- B. è indicata se il parto è imminente
- C. è raccomandata per ridurre il ricorso all'anestesia generale in caso di taglio cesareo in emergenza /urgenza
- D. nessuna delle precedenti

30 Nel primo trimestre di gravidanza si può porre diagnosi di diabete gestazionale se il valore della glicemia a digiuno è
- A. >= 120 mg/dl
- B. >= 126 mg/dl
- C. >= 92 mg/dl
- D. non è indicativo

QUIZ 2

1 In caso di rialzo pressorio materno durante il travaglio in acqua:
- A. è necessario far uscire la donna dall'acqua
- B. attuare una condotta d'attesa affinché i parametri si stabilizzino
- C. prestare sostegno psicologico
- D. è importante prolungare la permanenza della donna in vasca

2 Durante il secondo stadio del travaglio in acqua l'ostetrica deve:
- A. lasciare la donna sola con il partner
- B. auscultare il BCF ogni 5 minuti per almeno due minuti
- C. far assumere alla donna una posizione non comoda
- D. non utilizzare dispositivi di protezione individuale

3 Nella presentazione di fronte qual è il diametro di impegno?
- A. Sotto-occipito-bregmatico
- B. occipito-frontale
- C. mento-occipitale
- D. nessuna delle precedenti

4 L'American College of Obstretricians and Gynecologist (ACOG) raccomanda in merito al travaglio/parto in acqua:
- A. di offrire l'immersione in acqua a donne con gravidanza non complicata tra 37 e 42 settimane
- B. di informare le donne riguardo i dati insufficienti sui benefici e i rischi
- C. di stabilire, da parte dei centri, protocolli rigorosi che regolano tale procedura
- D. tutte le precedenti

5 Se un neonato è classificato alla nascita come LGA vuol dire che ha:
- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle precedenti

6 Quale tra questi è un criterio di esclusione fetale al travaglio/parto in acqua?
- A. IUGR (intra uterine growth restriction)
- B. feto singolo con presentazione cefalica
- C. BCF rassicurante
- D. aspetto del liquido amniotico chiaro

7 Il percorso Nascita fa parte dei programmi strategici di:
- A. progetto Obiettivo ASL
- B. progetto Obiettivi di budget della propria U.O.
- C. progetto Obiettivo Materno Infantile (D.M. 24 aprile 2000)
- D. progetto obiettivo correlato ai LEA

8 Lo screening per il carcinoma della cervice uterina è uno strumento in grado di:
- A. ridurre la mortalità per carcinoma
- B. ridurre l'incidenza della neoplasia invasiva
- C. favorire la diagnosi in una fase in cui il trattamento può essere efficace
- D. tutte le precedenti

9 Tutte le seguenti sono complicanze della pre-eclampsia, tranne:
- A. IUGR (intra uterine growth restriction)
- B. insufficienza renale
- C. ipoglicemia
- D. trombocitopenia

10 L'immersione in acqua durante il travaglio/parto:
- A. aumenta il rischio di ricovero del neonato in terapia intensiva neonatale
- B. aumenta il rischio di morte materna
- C. aumenta il rischio di ricorrere ad un taglio cesareo
- D. nessuna delle precedenti

11 Per il prelievo dall'esocervice è indicato l'utilizzo di:
- A. una spazzolina montata su uno stelo rigido (cytobrush)
- B. una curette
- C. una spatola di Ayre
- D. un'ansa ad uncino

12 Secondo la Società Scientifica AIPE (2013) i valori pressori che fanno propendere per una diagnosi di ipertensione in gravidanza sono:
- A. ≥ 140/90 mmHg
- B. 150/100 mmHg
- C. 135/85 mmHg
- D. nessuna delle precedenti

13 L'ipertensione gestazionale:
- A. insorge dopo la XX settimana di gestazione
- B. insorge prima della XX settimana di gestazione
- C. un ipertensione precedente l'insorgenza della gravidanza
- D. nessuna delle precedenti

14 Cosa si intende con il termine acrocianosi?
- A. disturbo circolatorio cronico che colpisce l'estremità degli arti
- B. colorazione violacea della zona temporale
- C. tutte le precedenti
- D. nessuna delle precedenti

15 Un neonato itterico sottoposto alla fototerapia deve essere esposto alla luce:
- A. vestito, senza particolari protezioni
- B. nudo, senza particolari protezioni
- C. nudo, con una benda a protezione degli occhi
- D. nessuna delle precedenti

16 E' indicato sottoporsi all'esecuzione di un pap test in corso di mestruazioni?
- A. si
- B. no. È indicato eseguire il prelievo in assenza di perdite ematiche e almeno tre giorni dopo la fine delle mestruazioni
- C. non ha importanza
- D. nessuna delle precedenti

QUIZ 2

17 La centralizzazione, l'appianamento e la dilatazione sono:
- A. modificazioni della cervice uterina
- B. fenomeni materni
- C. fenomeni dinamici del travaglio
- D. tutte le precedenti

18 Il detrusore è:
- A. il muscolo della vescica
- B. un muscolo del perineo
- C. un legamento dell'utero
- D. nessuna delle precedenti

19 Cosa significa l'acronimo CID?
- A. coagulopatia ischemica difforme
- B. chronic intravascular desease
- C. coagulazione infettiva diffusa
- D. coagulazione intravasale disseminata

20 E' fisiologico perdere le urine:
- A. non è mai fisiologico
- B. solo dopo il parto
- C. solo in menopausa
- D. solo in gravidanza

21 In caso di emorragia in atto durante il travaglio:
- A. è consigliato mettere la donna in vasca
- B. è sconsigliato mettere la donna in vasca
- C. è consigliato attendere l'arresto dell'emorragia per poi mettere la donna in vasca
- D. è consigliato procedere con l'induzione

22 Se un neonato è classificato alla nascita come "AGA" vuol dire che ha:
- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle precedenti

23 A parità di stimolo, un neonato percepisce
- A. più dolore rispetto alle età successive
- B. meno dolore rispetto alle età successive
- C. lo stesso dolore rispetto alle età successive
- D. nessuna delle precedenti

24 Per valutare il livello della parte presentata qual è il punto di riferimento materno?
- A. sacro
- B. coccige
- C. spine ischiatiche
- D. nessuna delle precedenti

25 In quale dei seguenti casi un obiettore di coscienza, è tenuto obbligatoriamente a partecipare, per quanto di sua competenza, ad interventi di interruzione volontaria di gravidanza:
- A. solo quando richiesto dalla donna
- B. solo quando il proprio intervento è indispensabile per salvaguardare la vita della donna
- C. solo quando è richiesto dal ginecologo
- D. solo quando è richiesto dal direttore sanitario

26 Secondo la Direttiva Europea 2005/36/CE (art. 42), gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'esercizio delle seguenti attività:
- A. effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale
- B. assistere la partoriente in travaglio e praticare il parto normale (compresa se necessario l'episiotomia e in caso di urgenza il parto podalico)
- C. accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale
- D. tutte le precedenti

27 Qual è la causa di morte più comune in donne che manifestano eclampsia?
- A. insufficienza epatica
- B. insufficienza renale
- C. emorragia celebrale
- D. nessuna delle precedenti

28 Secondo il Ministero della Salute (maggio 2021) qualora la madre sia sintomatica per la Sars-Cov2
- A. madre e bambino non dovrebbero essere separati
- B. se la madre presenta un'infezione con febbre, tosse o dispnea, madre e figlio andrebbero separati
- C. non andrebbe implementata la spremitura del latte materno
- D. nessuna delle precedenti

29 Il neonato pretermine presenta problemi di termoregolazione con tendenza all'ipotermia. Quale tra le seguenti sono alcune delle cause?
- A. immaturità dei meccanismi di termoregolazione
- B. difetto di termogenesi ed eccessiva termodispersione
- C. tutte le precedenti
- D. nessuna delle precedenti

30 L'acromion è l'indice fetale della presentazione di
- A. podice varietà natiche
- B. podice varietà piedi
- C. spalla
- D. asinclitica

QUIZ 3

1 Quale tra questi è un criterio di esclusione fetale al travaglio/parto in acqua?
- A. polidramnios
- B. feto singolo con presentazione podalica
- C. CTG non rassicurante
- D. tutte le precedenti

2 Un'ostetrica, come realizza attività di prevenzione oncologica?
- A. attraverso interventi educativi sulla popolazione femminile nelle diverse fasce di età e condizioni sociali e sanitarie
- B. attraverso la preparazione ed assistenza ad interventi chirurgici per patologie neoplastiche
- C. facendo, solo, una ricognizione della popolazione del proprio territorio sanitario
- D. nessuna delle precedenti

3 Il deficit di surfactante alveolare provoca:
- A. sindrome da polmone umido
- B. malattia delle membrane ialine polmonari
- C. sindrome da aspirazione massiva di meconio
- D. nessuna delle precedenti

4 Durante il primo stadio del travaglio in acqua è importante:
- A. monitorare la Temperatura dell'acqua
- B. monitorare il BCF con auscultazione ad intermittenza
- C. monitorare la FC materna ogni 2 ore
- D. tutte le precedenti

5 Quale tra le seguenti patologie neonatali non è associata ad infezione da rubeovirus in gravidanza?
- A. cecità
- B. focomelia
- C. sordità
- D. nessuna delle precedenti

6 Durante il travaglio e parto in acqua è raccomandato:
- A. un'assistenza ostetrica one to one
- B. evitare il monitoraggio dei parametri vitali materni
- C. lasciare la coppia in intimità per molto tempo
- D. evitare l'auscultazione del BCF

7 In caso di attacco eclamptico cosa si rende necessario fare?
- A. taglio cesareo d'urgenza
- B. espletamento del parto indipendentemente dalla metodica
- C. stabilizzare le condizioni della donna e del feto
- D. nessuna delle precedenti

8 Il perineo ha un comportamento:
- A. Attivo durante il parto, la defecazione e la minzione
- B. Non è attivo durante il parto, la defecazione e la minzione
- C. È attivo solo durante il parto
- D. È attivo solo per la defecazione

9 La vernice caseosa è formata da:
- A. secrezione sebacea
- B. detriti di cellule epidermiche
- C. tutte le precedenti
- D. nessuna delle precedenti

10 Il nucleo fibroso è situato:
- A. tra l'ano e la vulva
- B. tra la vulva e il meato urinario
- C. posteriormente all'ano
- D. sotto la vescica

11 Quale di queste metodiche è indicata per l'esecuzione di prelievi cervicali?
- A. brushing
- B. curettage endocervicale
- C. biopsia endometriale
- D. nessuna delle precedenti

12 In un neonato con distress respiratorio si osserva:
- A. aumento della frequenza respiratoria e rientramenti toracici
- B. vomito e irregolarità dell'alvo
- C. acidosi metabolica
- D. nessuna delle precedenti

13 Qual è il trattamento farmacologico routinario utilizzato per la eclampsia?
- A. naloxone
- B. solfato di magnesio
- C. diazepam
- D. nessuna delle precedenti

14 Quale tra le seguenti affermazioni circa l'ittero neonatale è sbagliata?
- A. ha la medesima incidenza nei neonati a termine e prematuri
- B. rappresenta una condizione clinica molto frequente nei neonati
- C. è una condizione caratterizzata da un cambiamento del colore della cute e delle sclere
- D. nessuna delle precedenti

15 Il test combinato o duo test prevede:
- A. la misurazione della translucenza nucale
- B. la misurazione della translucenza nucale in associazione con il dosaggio su siero materno della free-βhCG e α-fetoproteina
- C. la misurazione della translucenza nucale in associazione con il dosaggio su siero materno della free-βhCG e della PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein A)
- D. la misurazione della translucenza nucale in associazione con il dosaggio su siero materno della PAPP-A I (Pregnancy-associated plasma protein A) e InibinaA

16 Quali sono i fattori che favoriscono le emorragie endocraniche nei neonati?
- A. traumi
- B. prematurità
- C. tutte le precedenti
- D. Nessuna delle precedenti

17 In presenza di un utero bicolle per lo screening della cervice uterina è necessario attenersi a cosa?
- A. non si apportano modifiche alla modalità convenzionale
- B. basta un unico prelievo
- C. eseguire due prelievi separatamente ed indentificare su ognuno il lato
- D. se ne attuano due solo su richiesta dell'utente

QUIZ 3

18 La distanza ano-vulvare < 2 cm predispone:
- A. ad un danno perineale
- B. impedisce l' episiotomia
- C. ha un valore fisiologico
- D. ad un parto difficoltoso

19 Secondo la L.194/78 il medico del consultorio, della struttura sociosanitaria o il medico di fiducia di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza, non riscontrando il caso di urgenza, rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta e la invita a soprassedere:
- A. per 3 giorni
- B. per 2 settimane
- C. per 5 giorni
- D. per sette giorni

20 Secondo il Ministero della salute, le donne in gravidanza positive al nuovo coronavirus devono necessariamente effettuare un taglio cesareo?
- A. In relazione alle attuali conoscenze, non c'è indicazione elettiva al taglio cesareo
- B. Si, devono effettuare il taglio cesareo
- C. Devono effettuare il taglio cesareo solo se sono asintomatiche
- D. Nessuna delle precedenti

21 L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario:
- A. dall'assistenza conseguente all'intervento di interruzione della gravidanza
- B. dall'assistenza antecedente all'intervento di interruzione della gravidanza
- C. dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza
- D. da tutte le procedure inerenti l'interruzione di gravidanza

22 I vasi del cordone ombelicale decorrono in un tessuto denominato:
- A. tessuto connettivo
- B. tessuto fibroso
- C. gelatina di Wharton
- D. nessuna delle precedenti

23 In una paziente con pre-eclampsia quali delle seguenti anomalie si riscontrano più frequentemente nell'esame delle urine?
- A. proteinuria
- B. ematuria
- C. chetonuria
- D. tutte le precedenti

24 Secondo le raccomandazioni O.M.S. sulla qualità dell'assistenza prenatale per un'esperienza positiva di gravidanza (2016) tra gli interventi del sistema sanitario, per migliorare l'uso e la qualità dell'assistenza prenatale, è raccomandato:
- A. effettuare una valutazione clinica senza assegnare uno specifico profilo assistenziale
- B. aumentare il numero dei tagli cesarei
- C. per la donna in gravidanza, modelli di continuità assistenziale a conduzione ostetrica
- D. nessuna delle precedenti

25 Se un neonato è classificato alla nascita come SGA vuol dire che ha:
- A. misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
- B. misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
- C. misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
- D. nessuna delle precedenti

26 Con quale normativa dello Stato sono stati istituiti i Consultori Familiari in Italia?
- A. D.Lgs.502/1992
- B. L. n. 405/1975
- C. D.Lgs 517/1993
- D. L.833/1978

27 Tra gli ambiti di competenza consultoriale, rientra l'assistenza in gravidanza che può concretizzarsi attraverso tutte queste azioni, tranne:
- A. colloqui informativi sulla gravidanza
- B. corsi di preparazione al parto, alla nascita, al ruolo genitoriale
- C. non monitorare la crescita ed il benessere fetale anche mediante l'indirizzo a prestazioni di tipo strumentale
- D. adozione di cartella ostetrica ambulatoriale orientata da linee guida condivise

28 In caso di distocia di spalla quale manovra aumenta i diametri della pelvi?
- A. manovra di Mc Roberts
- B. manovra di Jacquemier
- C. manovra di Rubin 1
- D. manovra di Rubin 2

29 Quando è possibile immergere una donna in acqua?
- A. durante il travaglio attivo
- B. in caso di minaccia di parto pretermine
- C. in caso di emorragia in atto
- D. durante il terzo stadio del travaglio

30 L'arresto secondario della dilatazione è l'interruzione della dilatazione:
- A. durante la fase latente
- B. durante la fase attiva e prima della dilatazione completa
- C. a dilatazione completa
- D. nel III stadio del parto